

Bollettino fitosanitario olivo n. 11 del 22.09.2016

Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*) e occhio di pavone (*Spilocea oleaginea*)

Fase fenologica: Inizio invaiatura drupe (BBCH81)

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida proseguiranno con l'utilizzo di esche adulticide contenenti la s.a. spinosad (al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o potranno utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-(registrate per la mosca dell'olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa (nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva (uova e larve).

Si registrano catture nelle trappole a feromone installate nelle stazioni di monitoraggio in alcuni casi assai elevate.

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni diffuse di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) sul territorio regionale.

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Amelia Porchiano	4				2	2	
Amelia Fornole							X
Amelia Montecampano							X
Lugnano			8	1	3	4	
Narni Podernovo			12	9	3		

ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Assisi Beviglie			9	4	3	2	
Assisi Viola			52	50	2		
Foligno Sassovivo			11	3	5	2	
Foligno Sassovivo			18	6	11	1	
Foligno Scandolaro	3			3			
Foligno Scandolaro	2			2			
Foligno S. Eraclio			37	34	2	1	
Foligno S. Eraclio	4				3	1	
Foligno S. Eraclio			28	10	9	9	
Foligno- Vescia			50	24	26		
Gubbio- Pieve d'Agnano		6		1	5		
Gualdo Tadino Palazzo Mancinelli			21		5	16	
Gualdo Tadino Palazzo Mancinelli							X
Spello- Collepino							X
Spello S.Caterina	3					3	
Spello S.Caterina				0	0	0	
Spello S.Caterina		7				7	

Spoletto Eggi	1			1			
Spoletto Montepincio			10		6	4	
Spoletto Montepincio			17	2	8	7	
Trevi Mascio		7		2	2	3	
Trevi	3			3			
Valfabbrica Castagna Alta			9	3	1	5	
Stroncone Vascigliano							X
Terni San Carlo							X

ZONA DOP – COLLI MARTANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Bettona Sambro		5		3	2		
Bettona Montebalacca			36	7	4	25	
Castel Ritaldi Tevernano			12		3	9	
Castel Ritaldi Tevernano			15		6	9	
Castel Ritaldi Tevernano		5			4	1	
Castel Ritaldi Tevernano							X
Castel Ritaldi Terregrosso			15		8	7	
Castel Ritaldi S.Lorenzo							X

Castel Ritaldi S.Lorenzo							X
Castel Ritaldi Colle del Marchese							X
Castel Ritaldi Colle del Marchese							X
Collazzone- Canalicchio			16	4	1	11	
Collazzone Assignano							X
Deruta Casalina							X
Giano dell'Umbria Seggiano							X
Giano dell'Umbria- Formicaro		6		5	1		
Montefalco San Marco		6		1	2	3	
Montefalco San Marco	3			1	2		
Montefalco San Marco			17	5	8	4	
Montefalco San Marco			14	2	8	4	
Montefalco Loc Casale							X
Montefalco Loc Turri							X

ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Montecastello di Vibio			13	8	4	1	
Città della Pieve							X

ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Castiglione del lago Poderaccio			18	2	2	14	
Castiglione del lago Fornace	2			1	1		
Corciano Castelvieto		6			5	1	
Gubbio Pieve d'Agnano			33		11	22	
Magione S. Arcangelo			12		8	4	
Magione S. Arcangelo							X
Magione Andria			16	14	2	0	
Magione Monte del lago	1					1	
Magione Monte del lago	4			2		2	
Magione Monte del lago				0	0	0	
Magione S. Arcangelo							X
Panicale Colle S.Paolo			15		7	8	
Panicale Colle S.Paolo			8	1	4	3	
Panicale Montalera		6			2	4	

Panicale Montalera	3				1	2	
Panicale		6		1	2	3	
Panicale			8		3	5	
Panicale Cerreto		5	2	2	1		
Panicale Fontallaggio							X
Panicale Gioveto	2				1	1	
Panicale Gioveto							X
Panicale Gioveto							X
Panicale Mongiovino							X
Panicale Loc. Casalini		7		1	4	2	
Passignano sul Trasimeno							X
Passignano sul Trasimeno Campagna		5			3	2	
Passignano sul Trasimeno S.Donato							X
Passignano sul Trasimeno S. Donato							X
Passignano sul Trasimeno Colpiccione			16	6	10		
Perugia S.Girolamo	3					3	
Perugia Monteluca		5			5		
Perugia Pilonocopaterno							X
Perugia Rancolfo			15	1	10	4	

Perugia Rancolfo			13	7	6		
Piegaro Pietroso		6			4	2	
Tuoro Trasimeno Montecchio			26		11	15	
Tuoro Trasimeno Montecchio			19		6	13	
Umbertide Pian d'Assino	1				1		
Umbertide Migianella							X
Umbertide Colle del Sole							X
Umbertide Civitella Ranieri		6		1	4	1	

Campionamenti effettuati dal 15/09 al 21/9/2016

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata
nella sezione documenti

Gli interventi fitosanitari, relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata
nella sezione normative

In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- -Fosmet (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Dimetoato (al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità).

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate (D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe, nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

Previsioni di tempo stabile nei prossimi giorni con abbassamenti termici. Le condizioni climatiche risultano comunque favorevoli agli attacchi della mosca.

Occhio di pavone

In zone recettive e per cultivars suscettibili (moraiolo, frantoio, nostrale di rigali ecc...) si consiglia un (1) intervento con prodotti rameici (al massimo 6/kg di s.a./ha annui).

E' possibile scaricare l'APP – AGRICOLUS e ricevere, registrandosi, direttamente le informazioni.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato il 29 settembre

Gli Ispettori fitosanitari

Dr.ssa E. Consolani

Dott. G Natalini



Il Dirigente

Servizio Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario

Dott. Giuliano Polenzani

