

Bollettino fitosanitario olivo n. 8 del 01.09.2016

Difesa mosca olivo (*Bactrocera oleae*) e occhio di pavone (*Spilocea oleaginea*)

Fase fenologica: Indurimento nocciolo

Le aziende che praticano la difesa preventiva adulticida proseguiranno con l'utilizzo di esche adulticide contenenti la s.a. spinosad (al massimo 8 interventi/stagione) per ridurre la popolazione presente (persistenza 7-10gg; ripetere in caso di pioggia), o potranno utilizzare trappole innescate con feromone e impregnate con insetticida – attract and Kill-(registrate per la mosca dell'olivo).

Per le aziende che applicano la difesa curativa (nei confronti delle larve) i trattamenti vanno effettuati al superamento della soglia di intervento variabile dal 8% al 10 % di infestazione attiva (uova e larve).

Sulla base dei dati pervenuti ad oggi, da parte dei tecnici delle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO si registrano infestazioni di mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*) a macchia di leopardo sul territorio regionale in funzione dei fattori predisponenti gli attacchi (varietà, esposizione, turgidità drupe ecc...).

In particolare in base ai rilievi effettuati si riscontra quanto segue:

ZONA DOP – COLLI AMERINI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Amelia Porchiano							X
Amelia Porchiano							X
Amelia Montecampano							X
Lugnano	4				2	2	
Narni Podernovo							X

ZONA DOP – COLLI ASSISI SPOLETO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5 – 7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Arrone	3			1		1	
Assisi-Capodacqua	3			1		2	
Assisi Viole	4					4	
Assisi Beviglie	3					3	
Assisi Beviglie			8		3	5	
Foligno Sassovivo		6		2	1	3	
Foligno Sassovivo			16			16	
Foligno-S.Eraclio	4			4			
Foligno Scandolaro	0			0	0	0	
Foligno Scandolaro	0			0	0	0	
Foligno-S.Eraclio	4			2	2		
Foligno-S.Eraclio		6		6			
Foligno-Vescia							X
Gualdo Tadino-Palazzo Mancinelli		7			2	5	
Gualdo Tadino-Palazzo Mancinelli		5			1	4	
Gubbio-Pieve d'Agnano	3				1	2	

Spello- Collepio							X
Spello - S. Caterina	2					2	
Spello- S. Caterina	4					4	
Spello- S. Caterina	4					4	
Spoletto Montepincio							X
Spoletto Montepincio							X
Trevi Mascio	2				1	1	
Trevi							X
Valfabbrica Castagna Alta			13			13	
Stroncone Vascigliano							X
Terni	3					3	
Terni San Carlo	4			2		2	

ZONA DOP – COLLI MARTANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Bettona Sambro	-						X
Bettona Montebalacca	-		10	2	1	4	
Castel Ritaldi Tevernano	1					1	

Castel Ritaldi Tevernanao							X
Castel Ritaldi Tevernanao							X
Castel Ritaldi Tevernanao							X
Castel Ritaldi S.Lorenzo							X
Castel Ritaldi Colle del Marchese	0			0	0	0	
Castel Ritaldi Colle del Marchese							X
Collazzone- Canalicchio			12		1	11	
Collazzone Assignano							X
Deruta Casalina			22	10	12		
G.Cattaneo Colletifo		5			1	4	
Gualdo Cattaneo Rotolone		7			1	6	
Giano dell'Umbria	0			0	0	0	
Giano dell'Umbria- Formicaro							X
Montefalco Loc. Turri	4				4		
Montefalco Monteimperiale	3			1		2	
Montefalco San Marco	3			1		2	

Montefalco San Marco			10			10	
Montefalco San Marco		6			1	5	
Montefalco San Marco		7			1	6	
Torgiano	0			0	0	0	
Torgiano	1					1	

ZONA DOP – COLLI ORVIETANI

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Città della Pieve Moiano							X
Montecastello di Vibio			8		1	7	

ZONA DOP – COLLI TRASIMENO

Comune	Infest. Attiva <5%	Infest. Attiva 5-7 %	Infest. Attiva > 8% =	Uova	Larve I	Larve II III	Trattato
Castiglione del lago Poderaccio			11	4	4	3	
Castiglione del lago Fornace							X
Corciano Castelvieto							X
Magione S. Arcangelo	1				1		

Magione S. Arcangelo	3			1	1	1	
Magione Monte del lago	0			0	0	0	
Magione Monte del lago	0			0	0	0	
Magione Monte del lago	1					1	
Magione Andria	0			0	0	0	
Magione S. Arcangelo		6			2	4	
Paciano Montanaro	2			1	1		
Panicale Montalera		6				6	
Panicale Montalera		6			2	4	
Panicale	2					2	
Panicale Fontallaggio	2				1	1	
Panicale Gioveto	3			1	2		
Panicale Gioveto	4			2	1	1	
Panicale Gioveto							
Panicale Loc. Cerreto		7		1	2	4	
Panicale Loc. Casalini	4				1	3	
Panicale Mongiovino							X
Passignano sul Trasimeno	0			0	0	0	

Passignano sul Trasimeno Campagna		6			4	2	
Passignano sul Trasimeno S.Donato	0			0	0	0	
Passignano sul Trasimeno S. Donato	4			1	3		
Passignano sul Trasimeno S.Donato	1				1		
Passignano sul Trasimeno Colpiccione							X
Perugia S.Girolamo		7				7	
Perugia Monteluce	2					2	
Perugia Loc. La bruna			14		3	11	
Perugia Montelabata	2					2	
Perugia Pilonocopaterno							X
Perugia Rancolfo		5			3	2	
Perugia Rancolfo							X
Piegaro Pietroso							X
Tuoro Trasimeno Montecchio							X
Tuoro Trasimeno Montecchio							X
Umbertide Pian d'Assino	1				1		

Umbertide Molino Vitelli			16		5	11	
Umbertide Migianella							X
Umbertide Colle del Sole	0			0	0	0	

Campionamenti effettuati dal 25/08 al 31/8/2016

Per maggiori dettagli rivolgersi alle Organizzazioni APROL, ASSOPROL e OPOO. Il presente bollettino relativo alla difesa dell' olivo è reperibile al seguente indirizzo :

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata
nella sezione documenti

Gli interventi fitosanitari , relativamente alla lotta curativa, potranno essere effettuati al superamento della soglia di intervento con le s.a. previste nel disciplinare 2015 -2016 consultabile al seguente indirizzo internet:

www.regione.umbria.it/agricoltura/difesa-integrata
nella sezione normative

In particolare sono previsti interventi con le seguenti s.a.:

- -Fosmet (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Imidacloprid (al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità)
- -Dimetoato (al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità).

Complessivamente potranno essere effettuati nei confronti della mosca dell'olivo al massimo 2 interventi con le s.a. sopra indicate (D.D.Regione Umbria N. 6648 del 20.07.2016) salvo deroghe, nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi, concesse da questo Servizio.

Laddove l'infestazione risulti ridotta (1% – 2%) si consiglia di intervenire quanto prima con esche adulticide contenenti spinosad, per ridurre la presenza degli adulti di mosca.

Previste possibili piogge a partire dall' inizio della prossima settimana

Occhio di pavone

In zone recettive e per cultivars suscettibili (moraiolo, frantoio, nostrale di rigali ecc...) si consigliano interventi con prodotti rameici(al massimo 6/kg di s.a./ha annui).

Nel caso di miscele di prodotti rameici con i prodotti fitosanitari consigliati, per il controllo della mosca dell'olivo occorre verificare la compatibilità degli stessi.

E' possibile scaricare l'APP – AGRICOLUS e ricevere, registrandosi, direttamente le informazioni.

Il prossimo bollettino sarà pubblicato il 8 settembre

Gli Ispettori fitosanitari

Dr.ssa E. Consolani 

Dott. G Natalini 

Il Dirigente del Servizio

Innovazione, Promozione, Irrigazione, Zootecnia e Fitosanitario


Dr Giuliano Polenzani